

CALCITOP Calcium Bolus - Futterergänzung Milchfieberprophylaxe - 12 Boli à 95g

Art-Nr.: 16-010 / GTIN: 4038293160107 / Marke: [Landmans Best](#)



39,58 EUR / Stück

Grundpreis: 3,17 EUR / Stück

inkl. 7% USt. zzgl. Versand

AUF LAGER • Lieferzeit ca. 2-5 Werktage

50 auf Lager

CALCITOP ist ein diätetisches Mineralfuttermittel für Milchkühe in Form eines Bolus zur Verringerung des Risikos von Milchfieber und subklinischer Hypokalzämie. Der schnell lösliche Calciumzusatz wird an Milchkühe zur Verbesserung der Calciumversorgung ab den ersten Anzeichen vor dem Kalben bis zu zwei Tage nach dem Kalben verfüttert. Der Bolus enthält schnelllösliches Calciumformiat, das optimal aus dem Verdauungstrakt resorbiert wird sowie Calciumphosphat für die Aufrechterhaltung des Calciumspiegels. Zusätzlich angereichert mit Phosphor und Vitamin D3 für eine noch bessere Calcium-Mobilisation. Eignet sich auch zur kombinierten Milchfiebertvorbeuge bei Calcium- und Phosphormangel mit Phocaltop Bolus.

Fütterungsempfehlung:

- . 2 Boli 12 bis 24 Stunden vor dem Kalben
- . 2 Boli unmittelbar nach dem Kalben

Produktinformation

- . 1 oder 2 Boli je nach Bedarf 10 bis 12 Stunden nach dem Kalben
- . 1 oder 2 Boli je nach Bedarf 24 Stunden nach dem Kalben

Dosierung nach einer Calciuminfusion:

- . 2 Boli 2 Stunden nach der Infusion und erneut 2 Boli 12 Stunden nach der Infusion

Zusammensetzung:

- . Dicalciumphosphat, Magnesiumoxid, Calciumsalze organischer Säuren

Analytische Bestandteile:

- . Calcium: 27.0 %
- . Magnesium: 1.3 %
- . Natrium: < 0.1 %
- . Phosphor: 8.1 %

Calciumquellen:

- . E238 Calciumformiat: 13.4 %
- . Dicalciumphosphat: 13.6 %
- . Calcium Stearat: < 0,1 %

Zusatzstoffe:

- . 3a671 Vitamin D3: 233.000 IU
- . E238 Calciumformiat: 400.000 mg / kg

Lieferumfang:

- . 12x Calcitop Bolus à 95g

Hinweise für eine ordnungsgemäße Verwendung:



Produktinformation

- Verfütterung mit einem geeigneten Bolus-Applikator. Nicht bei liegenden Rindern anwenden. Zerbrochene oder beschädigte Boli nicht mehr verwenden. Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierernährungsberaters einzuholen.
- Die gleichzeitige Verabreichung von Vitamin D2 ist unzulässig